

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

CASTANHEIRO

Doença da Tinta no Castanheiro

(*Phytophthora cinnamomi*, *Phytophthora cambivora*)

Medidas de proteção e controlo:

Novas plantações:

- ✓ Utilização de porta-enxertos tolerantes a *Phytophthora*;
- ✓ Plante castanheiros certificados;
- ✓ Não fazer novas plantações expostas a Sul;
- ✓ Não plantar castanheiros em solos sujeitos a encharcamento frequente ou com má drenagem;
- ✓ Regar os castanheiros na entrelinha, não fazendo caldeiras, para evitar o encharcamento do solo;
- ✓ Antes da plantação, efetuar uma boa preparação do terreno – surriba, ripagem, lavoura profunda – para que as raízes possam ter um bom desenvolvimento;
- ✓ Aplicar estrume bem curtido;
- ✓ Efetuar adubações de fósforo e potássio e reduzir as adubações azotadas;
- ✓ Evitar a mobilização dos sotos;



Sotos instalados:

- ✓ Arranque total e destruição dos castanheiros infetados;
- ✓ Não plantar novamente no mesmo lugar;
- ✓ Manter o buraco aberto a arejar e ao sol;
- ✓ Plantar castanheiros resistentes à Tinta;
- ✓ Não fazer ou reduzir ao mínimo as mobilizações de solo.

Cancro do Castanheiro

(*Cryphonectria parasítica*)

Medidas de proteção e controlo:

- ✓ Em novas plantações, utilizar apenas plantas acompanhadas por passaporte fitossanitário;
- ✓ Nas enxertias, utilizar garfos retirados apenas de árvores sãs;
- ✓ Evitar fazer podas desnecessárias;
- ✓ As podas devem ser realizadas durante o mês de junho;
- ✓ Os cortes devem ser executados correctamente.

