

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO NORTE TRANSMONTANO

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA
(*Scaphoideus titanus*)

De acordo com a Portaria nº 267/2023, publicada no Diário da República nº 161, 1ª Série, de 21 de agosto de 2023, é obrigatória a luta contra este cicadelídeo em todas as vinhas das freguesias publicitadas pelo Despacho n.º 69/G/2026, de 28 de abril, da DGAV.

Assim, o terceiro tratamento é obrigatório nas Anelhe; Oura; Vilas Boas; Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, do concelho de Chaves; e nas freguesias Bornes de Aguiar; Bragado; Capeludos; Sabroso de Aguiar; Valoura; Vreia de Bornes; Pensalvos e Parada de Monteiros, do concelho de Vila Pouca de Aguiar, devem efetuar o terceiro tratamento, no período de **29 de agosto a 7 de setembro** (atenção ao intervalo de segurança do inseticida). Nas vinhas em que a vindima seja feita mais cedo (em agosto/início de setembro), o tratamento poderá ser adiado e realizado logo a seguir à vindima.




Videira com sintomas de Flavescência Dourada

TRAÇA DA UVA

Já terá sido atingido o pico do terceiro voo, que dará origem às lagartas da terceira geração da praga. Sendo esta geração a principal responsável por muitas das podridões que se verificam durante a vindima, aconselhamos os viticultores a realizar a estimativa do risco nas diversas parcelas de vinha, através da observação visual de posturas e perfurações.

Recordamos que o Nível Económico de Ataque é de 1 a 10% de cachos atacados (ovos e/ou perfurações), devendo observar-se, em cada parcela, dois cachos por videira em 50 videiras escolhidas ao acaso.

Caso seja necessário, deverá ser efetuado um tratamento dirigido aos cachos, com um inseticida cujo intervalo de segurança permita a realização da vindima na data prevista.



CIGARRINHA VERDE

Recomenda-se a vigilância das vinhas através da observação visual, principalmente nas vinhas com histórico desta praga, procurando as ninfas na página inferior das folhas. Deverão ser observadas 100 folhas por parcela homogénea de vinha (duas folhas escolhidas ao acaso em 50 videiras, preferencialmente na parte superior da videira e/ou nas netas). A decisão de tratar deverá ser tomada quando forem encontradas mais de 50 ninfas nas 100 folhas observadas.



Adulto e Ninfa de Cigarrinha



ESCA DA VIDEIRA

Ao longo deste verão têm-se observado sintomas característicos desta doença do lenho: as folhas adquirem cloroses, seguidas de necroses entre as nervuras principais; os lançamentos definham; as varas podem não atempar; e os cachos murcham ou secam. Estes sintomas podem ocorrer em toda a planta ou apenas em alguns dos seus órgãos.

Assim, aconselhamos os Senhores Viticultores a marcarem as videiras afetadas por esta doença, de forma a poderem adotar medidas preventivas e de recuperação das plantas aquando da poda de inverno.



Videira com sintomas de Esca

ESCALDÃO

Os cachos, quando excessivamente expostos e sob condições de elevadas temperaturas e baixa humidade relativa do ar, podem sofrer queimaduras solares. Como medida preventiva, recomenda-se a realização de desfolhas e despampas moderadas e cuidadosas, preferencialmente nas faces da sebe voltadas a norte e a nascente, evitando a desfolha nas faces expostas a sul e a poente.

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

Substância (s) Activa (s)	Acção		I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
	ovicida	larvicida			
azadiractina (a)		+	3	3681	ALIGN / SIPCAM (EC)
Bacillus thuringiensis (a)		+	-	1238	COSTAR WG / SYNGENTA (WG)
			1	1917	AGRICHEM (SC)
				1610	DELFIN WG / CERTIS BELCHIM (WG)
				1427	DIPEL DF/ IQV AGRO PT (WG)
				0172	DOCTRIN 32 / ASCENZA (WP)
				2348	LEPINOX / FITOSISTEMA (WG)
				1366	LEPINOX PLUS / FITOSISTEMA (WP)
				1561	RAPAX AS / FITOSISTEMA (SC)
				3799	SEQURA TOP / SIPCAM (WP)
				0173	VIJAY 32 / SELECTIS (WP)
cipermetrina		+	21	1635 0524 1072	CYPRESS / IQV AGRO PT (EC) CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC) CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)
clorantraniliprol	+	+	3 (***)	1698	ALTACOR / BAYER (WG)
			3 / 30 (*)	1694	CORAGEN / BAYER (SG)
				2329	COSAYR / CADUBAL(SC)
				2408	LEPSOVER / CORTEVA (SC)
				2407	LEXAPOR 200 SC / ASCENZA (SC)
				0226	LIPROLE / JOVAGRO (SC) ***
				2524	OPTERAPRO / NUFARM (SG)
				2218	SHENZI 200 SC/ UPL PORTUGAL (SC) ***
				2406	STREGIS 200 SC / SELECTIS (SC)
				2147	TECORLA / FITOSISTEMA (SC)
				2358	VOLIAM 20SC / SYNGENTA (SC) ***
deltametrina		+	7	1740	CONTRAST / CORTEVA (EC)
				0292	DECA / NUFARM (EC)
				0813	DECIS EVO / BAYER (EW)
				0107	DECIS EXPERT / BAYER (EC)
				1305	DELMUR / CADUBAL e EPAGRO e FITOSISTEMA (EC)
				0405	DELSTAR / ASCENZA (EC)
				0667	DELTAGRI / UPL IBÉRIA (EC)
				1759	DELTAGRONIS EVO / SERVAGRONIS (EC)
				2208	DELTAVALLES/ IQV AGRO PT (EC)
				0036	DELTINA / AGROTOTAL (EC)
				1125	DEMETRINA 25 EC / CQMASSÓ (EC)
				1447	DRONSAR / LUSOSEM (EC)
				2220	HEXSAR / RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE (RAEU) (EC)
				0449	PETRA / SELECTIS (EC)
				0462	POLECI / SHARDA (EC)
				1615	POTENCO / AGROTOTAL (EC)
				0675	SCATTO / CADUBAL (EC)
				0772	SHARP / CADUBAL (EC)
emamectina		+	7	4029	AFFIRM / SYNGENTA (SG)
espinetorame		+	7 (**)	1099	RADIANT SC / CORTEVA (SC) (Limite Comercialização:30/06/2026)
lambda-cialotrina		+	7	0176	ATLAS / SETECTIS (CS)
				0175	JUDO / ASCENZA (CS)
				0310	KAISO SORBIE / NUFARM (EG)
				0516	SPARVIERO / SIPCAM (CS)
			14	0132	CISOR / AGROTOTAL (CS)
				0020	KARATE ZEON / SYNGENTA (CS)
				0433	KARATE ZEON +1,5 CS / SYNGENTA (CS)
				2048	KHIAL 10 CS/ IQV AGRO PT (CS)
				0090	NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY / ADAMA (CS)

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2026)

Substância (s) Activa (s)	Acção		I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
	ovicida	larvicida			
spinosade (a)		+	14	2195 2188 2366 2237 2412 2190 2294 2351 2196 0288 2189 2403	ARCTISE 480 SC / SELECTIS (SC) BIAVRIO 480 SC / ASCENZA (SC) CLAYTON RELIC / JOVAGRO (SC) DUNGEON / EPAGRO (SC) KUNKOP 480 SC / UPL IBÉRIA (CS) MILSAJ / GENYEN (SC) RIPVIA / RAINBOW AGROSCIENCES (SC) SECURITY/ IQV AGRO PT (SC) SIMPELL / NUFARM (SC) SPINTOR / LUSOSEM e CORTEVA (SC) VOLKETE / ALBAUGH (SC) VOLKETE MAX / ALBAUGH (SC)
tau-fluvalinato		+	21	1225 1226	EVURE / SYNGENTA (EW) KLARTAN / ADAMA e CADUBAL (EW)
tebufenozida	+	+	30	1868	SOTA / SIPCAM (SC)

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA VERDE (2026)

Substância (s) Activa (s)	Homologado Traça	I. S. (dias)	N.º APV /AV/ACP	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamipride	Não	21	1175 0256 0164	CARNADINE / NUFARM (SL) CROVA / JOVAGRO (SL) STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL)
		14	0078	EPIK SG / SIPCAM (SG)
		45	2536 0717	EPIK 200 SL / SIPCAM (SL) EPIK SL / SIPCAM (SL)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio) (a)	Não	1	1046	FLIPPER / BAYER (EW)
beauveria bassiana (ATCC 74040) (a)	Não	1	1183	NATURALIS / FITOSISTEMA (OD)
cipermetrina	Sim	21	-	(ver lista da Traça)
deltametrina	Sim	7	-	(ver lista da Traça)
fenepiroximato	Não	28	246 1164	CORSA / JOVAGRO (SC) DINAMITE / SIPCAM (SC)
flupiradifurona	Não	14	1443	SIVANTO PRIME / BAYER (SL)
lambda-cialotrina	Sim	7	0310 0516	KAISO SORBIE / NUFARM (EG) SPARVIERO / SIPCAM (CS)
óleo de laranja (a)	Não	1	1432	OROCIDE / IDAINATURE (ME)
piretrinas (a)	Não	3	1049 1047 1666 1056 1048	ABANTO / EPAGRO (EC) KRISANT EC / SIPCAM (EC) LINCE / ALBAUGH (EC) NATUR BREAKER / CERTIS BELCHIM e CADUBAL (EC) PIRETRO NATURA / IDAINATURE (EC)
silicato de alumínio (a)	Não	3	1983	ARGICAL PRO / ANDERMATT IBERIA (WP)
tau-fluvalinato	Sim	21	-	(ver lista da Traça)

A consulta destes quadros, não dispensa a consulta do site: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>)

Acção: Ovicida - Provocam a morte do embrião. Estes produtos devem ser aplicados antes do início das posturas Larvicida - Provocam a morte das pequenas lagartas. Devem ser posicionados imediatamente antes da eclosão dos ovos (a) - autorizado em modo de produção biológica. Intervalo de Segurança (I.S.): (*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação (**) - Não pode ser usado em uva de mesa (***) - Não pode ser usado em uva para vinificação	Formulação (Form.): CS - suspensão de cápsulas EC - concentrado para emulsão EG - grânulos para emulsão EW - emulsão óleo em água ME - microemulsão OD - Dispersão em óleo SC - suspensão concentrada SG - grânulos solúveis em água SL - solução concentrada SP - suspensão WG - grânulos dispersíveis em água
--	--

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (2026)

(*Scaphoideus titanus*)

Substância (s) Activa (s)	Alvo Biológico	I. S. (dias)	Traça da uva	Nº Ap.	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamiprida (neonicotinoide)	Ninfas/Adultos	21	Não	1	CARNADINE / NUFARM (SL)
		14			CROVA / JOVAGRO (SL)
		45			STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Ninfas/Adultos	1	Não	5 (a)	EPIK SG / SIPCAM (SG)
azadiractina (limonoide)	Ninfas	3	Sim	3 (a)	EPIK 200 SL / SIPCAM (SL)
beauveria bassiana (ATCC 74040)	Ninfas	1	Não	10 (a)	EPIK SL / SIPCAM (SL)
cipermetrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	1	FLIPPER / BAYER (EW)
deltametrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	3	ALIGN / SIPCAM (EC)
fenepiroximato (pirazol)	Ninfas/Adultos	28	Não	1	NATURALIS / FITOSISTEMA (OD)
flupiradifurona (butenolides)	Ninfas/Adultos	14	Não	1	CYPRESS / IQV AGRO PT (EC)
lambda-cialotrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	2	CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC)
piretrinas (piretróide)	Ninfas/Adultos	3	Não	2 (a)	CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)
		1			CONTRAST / CORTEVA (EC)
		3			DECIS EVO / BAYER (EW)
tau-fluvalinato (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	2	DELTA / AGROTOTAL (EC)
A consulta deste quadro, não dispensa a consulta do site: SIFITO (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios)					

(I.S.) - Intervalo de Segurança O intervalo de segurança refere-se a uvas para vinificação. (*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação (**) - Não pode ser usado em uva de mesa (Nº Ap.) - Número Máximo de Aplicações por Ano: (a) - autorizado em modo de produção biológica.	(Form.) - Formulação : CS - suspensão de cápsulas EC - concentrado para emulsão EG - grânulos para emulsão EW - emulsão óleo em água OD - Dispersão em óleo SC - suspensão concentrada SL - solução concentrada WG - grânulos dispersíveis em água
---	--

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

“Senhor Viticultor,

Se a sua vinha se situa numa freguesia de tratamento obrigatório à cigarrinha que transmite a doença da Flavescência Dourada da videira, deve ler com atenção os avisos agrícolas, a fim de poder realizar os tratamentos inseticidas obrigatórios por lei, nos prazos e com os produtos recomendados.

O não cumprimento desta obrigatoriedade ficará sujeita à aplicação de coimas.

Informe-se junto dos serviços de Agricultura da CCDR Norte do seu concelho ou junto da sua Associação.”